



## RYDER HEALTH PLAN, INC.

*Servicios dentales preventivos cubiertos bajo Obamacare, sin costo compartido*

*Cubiertas Ryder Directo Platino y Ryder Directo Oro*

**2023**

Procedimiento	Código de procedimiento dental (CDT)	ICD-10 Relacionado
Servicios dentales de rutina para adultos y niños	D0150, D0120	Z01.20, Z01.21
Examen dental (inicial, periódicos y de emergencia)	D0150, D0120, D0140	Z01.20, Z01.21, Z13.84
Sellantes de fisura	D1351	K02.51, K02.61, M35.00
Limpiezas (cada 6 meses)	D1110, D1120	K03.6, K05.1, K05.10, K05.3, Z72.0
Radiografías (bitewings y periapicals) un par, cada 3 años	D0272, D0220, D0230, D0330	Z01.20, Z01.21, Z13.84
Aplicación de fluoruro	D1208	K02.3, K02.61, K02.7, K03.1, K03.2, M35.00
Salud oral – Evaluación de riesgos para niños pequeños	. Edades: 0 a 11 meses, 1 a 4 años, 5 a 10 años.	
Prevención de caries dental en niños menores de 5 años: detección e intervenciones: niños menores de 5 años –	El USPSTF recomienda que los médicos de atención primaria prescriban suplementos de fluoruro oral a partir de los 6 meses de edad para los niños cuyo suministro de agua es deficiente en fluoruro. Además, la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) recomienda que si la fuente de agua primaria es deficiente en fluoruro, considere la administración de fluoruro oral suplementación. El USPSTF recomienda que los médicos de atención primaria apliquen barniz de fluoruro a los dientes primarios de todos los bebés y niños a partir de la edad de erupción del diente primario. Una vez que los dientes estén presentes, aplique barniz de flúor a todos los niños cada 3 a 6 meses en la atención primaria o en el consultorio dental según el riesgo de caries	